



令和4年度

定期予防接種について

【問合せ】
豊頃町役場福祉課健康係
015-574-2214

定期予防接種は予防接種法で定められているもので、お子さんの健やかな成長のために必要なものです。定期予防接種は対象年齢を過ぎてしまうと、任意接種となり、費用の助成が受けられなくなってしまうため、対象年齢内で受けられるように計画的に進めましょう。

対象疾病	対象年齢	標準的な接種期間	受け方
ロタ (ロタウイルス感染症)	生後6週0日から24週0日までの間 (2回)	初回接種(1回目)を生後2か月になった日から生後14週6日までの間 (15週0日以降の1回目の接種は安全性が確立されていません)	1価 (ロタリックス) ①生後2ヵ月 → ②生後24週 接種した日から27日以上あける
ヒブ (Hib感染症)	生後2か月になった日から5歳の誕生日の前日まで	初回接種は生後2か月になった日から生後7か月になる前日まで(3回) 追加接種は初回接種3回目を接種した次の日から7か月~13か月までの間隔をおく(1回)	初回接種 生後2か月 ① → ② → ③ 接種した日から27日以上(標準的には27日~56日まで)の間隔をあける 追加接種 生後7か月 ④ 初回接種終了後、7か月以上(標準的には7か月~13か月まで)の間隔をあける
小児肺炎球菌 (小児の肺炎球菌感染症)	生後2か月になった日から5歳の誕生日の前日まで	初回接種は生後2か月になった日から生後7か月になる前日まで(3回) 追加接種は1歳になった日から1歳3か月になる前日まで(1回)	初回接種 生後2か月 ① → ② → ③ 接種した日から27日以上の間隔をあける 追加接種 生後7か月 ④ 初回接種終了後、60日以上(標準的には1歳になった日から1歳3か月になる前日まで)の間隔をあける
B型肝炎	1歳の誕生日の前日まで	初回接種は生後2か月になった日から生後9か月になる前日まで(2回) 追加接種は初回接種1回目を接種した次の日から、139日以上の間隔をおく(1回)	初回接種 生後2か月 ① → ② 接種した日から27日以上の間隔をあける 追加接種 1歳 ③ 初回接種1回目終了後、139日以上の間隔をあける
四種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)	生後3か月になった日から7歳6か月になる日の前日まで	初回接種は生後3か月になった日から1歳の誕生日の前日まで(3回) 追加接種は初回接種3回目を接種した次の日から、12か月~18か月までの間隔を空ける(1回)	初回接種 生後3か月 ① → ② → ③ 接種した日から27日以上(標準的には27日~56日まで)の間隔をあける 追加接種 1歳 ④ 初回接種終了後、6か月以上(標準的には12か月~18か月まで)の間隔をあける
BCG(結核)	1歳の誕生日の前日まで	生後5か月になった日から生後8か月になる日の前日まで(1回)	生後5か月になったら早めに受けましょう
麻疹風疹1期	1歳のお誕生日から2歳のお誕生日の前日まで(1回)		1歳になったら早めに受けましょう
水痘 (水ぼうそう)	1歳のお誕生日から3歳のお誕生日の前日まで(2回)		①1歳 → ②3歳 3か月以上(標準的には6か月~12か月まで)の間隔をあける