

【問い合わせ】 福祉課健康係 015-574-2214

病気からお子さんを守るために予防接種を受けましょう。定期接種の対象年齢を過ぎると、任意接種(有料)になってしまうため、計画的に進めましょう。

「赤ちゃん訪問 (P4)」でご案内する予防接種

予防接種名・対象年齢	回数		標準的な接種期間	接種間隔・注意すること
ロタウイルス 生後6週~ 24週0日まで	初回	20	生後2か月~ 14週6日まで	27日以上の間隔をあけて2回接種してください。生後 15週以降の1回目の接種は安全性が確立されていないため、お早目に接種してください。
小児肺炎球菌 ^{※ 1} 生後2か月~	初回	3 🗆	生後2か月~ 7か月になる前まで	27日以上の間隔をあけて3回接種してください。 1回目が生後7か月を超える場合、接種回数が変わるので接種医にご相談ください。
5歳になる前まで	追加	1 🗆	1歳~1歳3か月 になる前まで	3回目接種後、60日以上間隔をあけて1回接種してください。
B 型肝炎	初回	2 🗆	生後2か月~	27 日以上の間隔をあけて2回接種してください。
1歳になる前まで	追加	1 🗆	9か月になる前まで	1回目から 139 日以上あけて1回接種してください。
Hib(ヒブ) 生後2か月〜 5歳になる前まで	初回	3 🗆	生後2か月~ 7か月になる前まで	27日以上の間隔をあけて3回接種してください。1回目が生後7か月を超える場合、接種回数が変わるので接種医にご相談ください。
※4種混合ワクチンを 接種される方	追加	1 🗆	3 回目から 7 ~ 13 か月間隔をあける	3回目接種後、7か月以上間隔をあけて1回接種してください。
4種混合 (ジフテリア・百日咳・	初回	3 🗆	生後2か月~1歳になる前まで	20 日以上の間隔 (20 ~ 56 日) をあけて 3 回接種してください。
破傷風・ポリオ) 生後2か月から 7歳6か月になる前まで	追加	1 🗆	3 回目から 12 ~ 18 か月間隔をあける	3回目から6か月以上の間隔をあけて1回接種してください。※2期は小学校6年生時にご案内します。
5種混合 ** ² (ジフテリア・百日咳・	初回	3 🗆	生後2か月~7か月になる前まで	20日以上の間隔 (20~56日) をあけて3回接種してください。
破傷風・ポリオ・Hib) 生後2か月から 7歳6か月になる前まで	追加	1 🗆	3回目から6~18 か月間隔をあける	3回目から6か月以上の間隔をあけて1回接種してください。※2期は小学校6年生時にご案内します。
BCG 1歳になる前まで	1 0		生後5か月~8か月になる前まで	スタンプ形式で接種します。
麻しん風しん 1歳から2歳になる前まで	1期	1 🗆	1歳以降できるだけ 早期に接種	満1歳になったらできるだけ早く接種しましょう。2期は 小学校就学前の年度にご案内します。
水痘 1歳から3歳になる前まで	20		1回目は生後12〜15 か月になる前まで	3か月以上 (標準的には6~12か月)の間隔をあけて2回接種してください。

- ※1 小児肺炎球菌ワクチンは令和6年4月1日から15価肺炎球菌結合型ワクチンが定期接種の対象になります。
- ※2 5種混合ワクチンは令和6年4月1日から定期接種の対象になりました。令和6年4月1日までに4種混合ワクチンで接種を開始した方は、原則同一ワクチンで残りの接種を行います。

自宅に案内を送付する(個別通知) ワクチン

予防接種名・対象年齢	回数		標準的な接種期間	接種間隔・注意すること
麻しん風しん2期 5歳から7歳になる前まで	2期	10	小学校就学前の1年 間(4月~3月)	令和6年度は平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの方へご案内を送付します。
二種混合 (ジフテリア・破傷風) 11 歳から 13 歳になる前まで	2期	1 0	11 歳~12 歳にな る前まで	令和6年度は平成24年4月2日〜平成25年4月1日生まれの方へご案内を送付します。